

Análises de A a Z

Código	Designação	Colheita	Nº de Dias	Observações
274	17 - Beta-Estradiol	Sangue	2	O mesmo que Estradiol e/ou E2.
273	17 – Cetosteroides totais	Urina	8	17 – KS Urina de 24 horas. Como alternativa recomenda-se a determinação de dehidroepiandrosterona-sulfato, no soro. Suspender todas as drogas 72 horas antes do início da colheita (Mod 36.1)
170HC	17 - Hidroxicorticoesteróides	Urina	8	Urina de 24 horas (Mod 35.1)
272	17 - OH-Progesterona	Sangue	8	
100	4 - Androstenediona	Sangue	8	Ver Delta-4-Androstenediona
261	5 - HIAA	Urina	8	Ác. 5-Hidroxiindolacético. Dieta prévia, apropriada (evitar bananas, tomates, ananases, etc) 3 dias antes do início da colheita. (Mod 36.1)
148	5' Nucleotidase (5'N)	Sangue	8	Jejum
620	Ac HBc IgM	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite B). Teste quantitativo
620	Ac HBc total	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite B). Teste quantitativo
146	Ac Hbe	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite B)
67	Ac Hbs	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite B). Teste quantitativo
52	Ac HVA (IgM)	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite A)
52	Ac HVA (Total)	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite A)
261	Ác. 5 - Hidroxiindolacético	- - -		5 – HIAA Dieta prévia, apropriada (evitar bananas, tomates, ananases, etc) 3 dias antes do início da colheita. (Mod 36.1)
Borreli	Ac. Anti-Borreli	Sangue	8	Ver Doença de Lyme
278	Ac. Anti-Citomegalovírus (IgM e IgG)	Sangue	5	CMV – IgM Jejum, preferencialmente
LKM	Ac. Anti-LKM	Sangue	8	
291	Ac. Anti-Rubéola (IgM e IgG)	Sangue	5	Jejum
289	Ac. Anti-Toxoplasmose (IgM e IgG)	Sangue	5	Jejum
260	Ácido Fólico	Sangue	5	Jejum
95/AUU	Ácido Úrico	Sangue/Urina	2	S: Jejum; U: Urina de 12/24 horas (Mod 35.1)
265	Ácido Valproico	Sangue	8	Amostra ocasional; Anotar o nome do medicamento e dose prescritas, hora da última toma do medicamento
264	Ácido Vanilmandélico	Urina	8	Ver VMA; Dieta s/ café, baunilha, chocolate, etc; Medicamentos: aspirina, etc; Urina 24 horas (Mod 36.1)
10	ACTH	Sangue	8	
ADDIS	Addis (Contagem) de24h	Urina	2	(Mod 35.1)
HORMON	ADH	Sangue	8	O mesmo que Hormona Anti-diurética

227	AFP	Sangue	3	Alfa-Fetoproteína; Jejum
146	Ag Hbe	Sangue	5	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite B)
140	Ag Hbs	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum; (marcador Hepatite B)
ALBS	Albumina	Sangue	3	Jejum
	Álcool	Sangue	8	
269	Aldolase	Sangue	8	
ALDOSTU	Aldosterona	Sangue/Urina	8	Urina de 24 horas (Mod 36.1) Dieta de Sódio normal
250	Alfa 1 Antitripsina	Sangue	3	Alfa-1-AT. Jejum
227	Alfa-Fetoproteína	Sangue	3	Ver AFP
AL	Alumínio	Sangue	8	Jejum
239	AMA (Ac. Anti-Mitocondriais)	Sangue	8	O mesmo que Ac. Anti-M2
116	Amilase	Sangue/Urina	3	S: Jejum (Excepto em SOS) U: Urina de 24 horas (Mod 35.1)
259	ANA (Anticorpos anti-nucleares)	Sangue	2	Jejum
ANCA	ANCA	Sangue	8	Constituído por Ac. Anti-MPO e Ac. Anti-PR3
DELTA	Anti - HDV	Sangue	8	Anticorpos Anti-Hepatite Delta
235	Anticorpos Anti-ADN	Sangue	2	Ac. Anti- ds DNA
Brucel	Anticorpos Anti-Brucella	Sangue	8	
AC-CARD	Anticorpos Anti-Cardiolipina, IgG + IgM	Sangue	8	Jejum
244	Anticorpos Anti-Músculo Liso (ASMA)	Sangue	8	
230	Anticorpos Anti-RNP	Sangue	8	
SCL-70	Anticorpos Anti-Scl 70	Sangue	8	
232	Anticorpos Anti-SS-A (Ro)	Sangue	8	Anti-Ro
SSB/LA	Anticorpos Anti-SS-B (La)	Sangue	8	Anti-La
626*	Anticorpos anti-tiroideus	Sangue	3	Anti-Tiroglobulina e Anti-TPO (anti fracção peroxidases; anteriormente designado anti-microsossomiais); Jejum
50	Antigénio Carcino-Embrionário	Sangue	2	Ver CEA Jejum
228	Antitrombina III	Sangue	8	Jejum; Separar por centrifugação. Não efectuar a colheita se o doente estiver a fazer medicação anti-trombótica
66	Anti-V.Herpes Tipo I (IgG/IgM)	Sangue	8	
66	Anti-V.Herpes Tipo II (IgG/IgM)	Sangue	8	
535	Apolipoproteína A1	Sangue	8	Apo A1. Jejum de 12 horas.
536	Apolipoproteína B	Sangue	8	Apo B. Jejum de 12 horas.
BMP-U BMP-EX BMP-VA BMP-PU	Bacteriológico + Micológico + Parasitológico	Urina/Expectoração/EV/P/Fezes	8	S: Ver Hemoculturas U: Ver Uroculturas F: Ver Coproculturas EX: Ver Expectoração e Secreções brônquicas E: Ver Exsudados EV: Ver Exsudado vaginal P: Ver Pús e Líquidos das Cavidades Serosas
BENZO	Benzodiazepinas	Sangue/Urina	8	U: urina ocasional
Beta2 U	Beta-2 Microglobulina	Sangue	8	Jejum
13	Beta-HCG	Sangue	2	Hormona Gonadotrofina coriónica (fracção beta)
106	Bilirrubinas (T+D+I)	Sangue	2	Jejum, preferencialmente Proteger da luz solar directa;

BKD-EX BKD-UR	BK (Ex. Directo)	Expectoração/Urina	3	
BKC-EX BKC-UR	BK (Exame Cultural)	Expectoração/Urina	30	Cultura em Lowenstein
C1 Est	C'1 Estearase (Inibidor da)	Sangue	8	
242	C'3	Sangue	5	
243	C'4	Sangue	5	
18	CA 125	Sangue	2	Jejum
28	CA 15.3	Sangue	2	
19	CA 19.9	Sangue	2	
402	Ca Ionizado	Sangue	8	Jejum.
113	Cálcio	Sangue	2	S: Jejum
113U	Cálcio	Urina	3	U: Urina de 24 horas (Mod 35.1)
267	Calcitonina	Sangue	8	Jejum.
179	Cálculo Urinário	CÁLCULO	8	
74	Capacidade de Fixação de Ferro	Sangue	2	Jejum
CARBA	Carbamazepina	Sangue	8	Jejum
CATTOT	Catecolaminas totais	Urina	8	Urina de 24 horas c/ HCl (Mod 36.1)
CATS/ CATTOT	Catecolaminas Totais ou Fraccionadas (Adrenalina + Noradrenalina)	Sangue/Urina	8	S: Suspender a medicação nas 2 semanas anteriores c/ alfa metildopa. U: Urina de 24 horas (Mod 36.1)
50	CEA	Sangue	2	Antigénio Cárcino-Embrionário; Jejum
20	Células LE	Sangue	2	Jejum
275	Ceruloplasmina	Sangue	8	Jejum
240	CH50	Sangue	8	Jejum
PB-Abs	Chumbo	Sangue/Urina	8	U: 24 horas (Mod. 35.1)
278*	Citomegalovírus (Ac. das classes IgM e IgG)	Sangue	2	CMV - IgM e CMV- IgG Jejum, preferencialmente
278	Citomegalovírus IgM	Sangue	2	Ver Ac. Citomegalovírus IgM e Ac. Citomegalovírus IgG
A466	Citrato na urina	Urina	8	Urina de 24 horas (Mod 35.1)
111	CK = Creatinquinase	Sangue	2	Evitar exercício físico intenso
112	CK MB	Sangue	2	Creatina Kinase (fracção MB)
Cl	Cloro	Sangue/Urina	2	S: Jejum; excepto em SOS U: Urina de 24 horas (Mod. 35.1)
CUS	Cobre	Sangue	8	
CUU	Cobre	Urina	8	U: Urina de 24 horas (Mod. 35.1)
11	Colesterol HDL	Sangue	2	Jejum 12 h; mínimo 8h
98	Colesterol LDL	Sangue	2	Jejum 12 h; mínimo 8h
96	Colesterol Total	Sangue	2	Jejum 12 h; mínimo 8h
302	Colesterol Total, Livre e Esterificado	Sangue	2	Jejum 12 h; mínimo 8h
COOMBD	Coombs Directa	Sangue	2	Amostra ocasional
29	Coombs Indirecta	Sangue	2	Amostra ocasional
277	Coprocultura	Fezes	8	Exame Bacteriológico de Fezes
22	Cortisol	Sangue/Urina	8	S: se s/ indicação de horário – tão cedo quanto possível; se múltiplas colheitas – cumprir horário prescrito e registar hora de cada colheita; U: Urina de 24 horas (Mod 35.1)
94	Creatinina	Sangue/Urina	2	S: Jejum U: Urina de 24 horas (Mod 35.1)
CRIAG	Crioaglutininas	Sangue	8	

CRIOGLP	Crioglobulina	Sangue	8	Jejum
CROMIO	Crómio	Sangue	8	
100	Delta 4 - Androstenediona	Sangue	8	Colheita de manhã cedo.
153	Depuração da Creatinina ou Clearance da creatinina	U+S	2	S: Jejum U: Urina de 24 horas (Mod 35.1)
434	Desidrogenase Láctica	Sangue	2	Ver DHL
DHEA	DHEA Sulfato	Sangue	8	Dehidroepiandrosterona sulfato Jejum
	DHEA urinária	Urina	8	Urina 24 horas (Mod 35.1) Refrigerar durante a colheita.
434	DHL	Sangue	2	Desidrogenase Láctica; LDH ou LD; Jejum
107	Difenil - Hidantoína	Sangue	8	Fenitoína; Hidantoína. Colheita antes da toma do fármaco.
DIGOX	Digoxina	Sangue	2	Jejum; Excepto se SOS. Colheita antes da toma do fármaco.
LYME	Doença de Lyme	Sangue	8	Ver Ac. Anti-Borrelia
	Drogas de abuso (pesq.)	Urina	2	Urina de ocasião (Canabinóides; Opiácios e Cocaína)
ELHB	Electroforese das Hemoglobinas a pH Alcalino	Sangue	8	
110	Enzima Conversor da Angiotensina	Sangue	8	SACE ou ECA. Jejum
	Eritrograma	Sangue	2	Ocasional
	Eritropoietina	Sangue	8	
EB-ES	Espermocultura com Antibiógrama	Esperma	8	
ESPERM	Espermograma	Esperma	2	Abstinência sexual de pelo menos 3 dias
295	Estradiol total	Sangue	2	O mesmo que 17-Beta Estradiol e/ou E2.
ESTR.LI	Estriol livre	Urina	8	U: 24 horas (Mod. 35.1)
256	Estriol Total	Sangue	8	
257	Estrona	Sangue	8	
ETANOL	Etanol	Sangue	8	Álcool Etílico.
300	Exame Bacteriológico de Urina	Urina	3	Colheita asséptica do 2º jacto (Mod. 33.1 - Homens e Mod. 34.1 - Senhoras)
217	Exame Parasitológico de Fezes	Fezes	2	Colher fragmento c/ cerca 1 cm3; Refrigerar
76	F. S. H. Hormona Foliculo-Estimulante	Sangue	2	Hormona Foliculo-Estimulante; Jejum; Registrar momento do ciclo menstrual
36	Fenobarbital	Sangue	8	Colher antes da toma matinal de preferência.
127*	Ferritina	Sangue	2	Jejum
125	Ferro	Sangue	2	Jejum
393	Fibrinogénio	Sangue	3	Jejum
108	Fosfatase Ácida	Sangue	8	Jejum; Não colher nos dias seguintes a exame físico, ecográfico ou biópsia da próstata
109-1	Fosfatase Ácida Total + F. Prostática	Sangue	8	Jejum; Não colher nos dias seguintes a exame físico, ecográfico ou biópsia da próstata
105	Fosfatase Alcalina	Sangue	2	Jejum
114	Fósforo	Sangue/Urina	3	S: Jejum U: Urina de 12/24 horas; refrigerar
	Fragilidade Osmótica	Sangue	8	
75	Frutosamina	Sangue/Urina/Esperma	8	
101	FTA/ABS	Sangue	2	Amostra ocasional, de preferência em jejum
104	Gama Glutamil Transferase	Sangue	2	Ver Gama-GT. Deve suprimir a ingestão de Fenitoína e Fenobarbital nos dias prévios à colheita.

104	Gama-GT	Sangue	2	Gama Glutamil Transferase; Jejum
GASTR	Gastrina	Sangue	8	Não fumar. Suspender anti-ácidos 24 h.
164	Glicose 2h após almoço	Sangue	2	Recomendar refeição habitual; Colheita 2h após a refeição
92	Glicose Jejum	Sangue	2	Jejum
	Grau de Digestão dos alimentos nas fezes	Fezes	2	1ª Dejeção do dia
61	Grupo Sanguíneo	Sangue	2	Ocasional
HAPTOG	Haptoglobina	Sangue	8	Jejum, excepto em SOS
13	HCG	Sangue	2	
47	HCV	Sangue	2	Anticorpos Anti-Vírus da Hepatite C; (marcador da Hepatite C); Ocasional, de preferência em jejum
DELTA*	HDV Ac. Anti-Vírus da Hepatite Delta	Sangue	8	Anticorpos Anti-Vírus da Hepatite Delta; (marcador da Hepatite Delta); Ocasional, de preferência em jejum
HEMOC	Hemocultura	Sangue	8	
HEM. A2	Hemoglobina A2	Sangue	2	
455	Hemoglobina Glicosilada	Sangue	2	Hemoglobina Glicada; HbA1c; Ocasional, de preferência em jejum
3	Hemograma	Sangue	2	Amostra ocasional
	Hidantina	Sangue	8	
176	HIV 1	Sangue	2	Ocasional, de preferência em jejum
176	HIV 2	Sangue	2	Ocasional, de preferência em jejum
293*	HLA B27	Sangue	8	Colheita até às 5ªs feiras; Deve dar entrada no laboratório até às 10.00h
287	Hormona do Crescimento	Sangue	8	GH; Somatotrofina; STH
165	IgA	Sangue	2	Jejum
86	IgE	Sangue	2	Jejum
166	IgG	Sangue	2	Jejum
166	IgG 1	Sangue	8	Jejum
	IgG 2	Sangue	8	Jejum
	IgG 3	Sangue	8	Jejum
	IgG 4	Sangue	8	Jejum
167	IgM	Sangue	2	Jejum
IMUNOC	Imunocomplexos	Sangue	8	
IMUNOEL	Imunoelectroforese	Sangue/Urina	8	Substituída por Electroimunofixação. S: Jejum U: Urina de 24 horas
	Imunoglobulinas (IgA; IgG; IgM)	Sangue	2	Jejum
298	Insulina	Sangue	8	
118	Ionograma	Sangue/Urina	2	S: Ocasional, de preferência em jejum; U: Urina de 24 horas (Mod. 35.1)
	Isulubilidade da Hemoglobina	Sangue	8	
26	L. H.	Sangue	2	Jejum. Hormona Luteínica
	LAP	Sangue	8	Leucina - Aminopeptidase
	LDH	Sangue	2	Ver DHL
	Linfócitos CD4 + (T4)	Sangue	8	
	Linfócitos CD8 + (T8)	Sangue	8	
117	Lipase	Sangue	5	Jejum
150	Lipidograma	Sangue	2	Jejum
151	Lipidograma (perfil)	Sangue	2	Jejum

Li	Lítio	Sangue	8	Jejum; Anotar dose e hora da última toma; idade e peso do doente
LPA	Lp (a)	Sangue	8	Jejum
LYME	Lyme (Doença de)	Sangue	8	Ver Ac. Anti-Borrelia
115	Magnésio	Sangue	3	Jejum
	Magnésio Intracelular	Sangue	8	
HGS-ABS	Mercúrio	Sangue	8	Hg
METANE	Metanefrinas Totais	Urina	8	Urina de 24 horas + Dieta prévia apropriada (Mod. 36.1)
500	Microalbuminúria	Urina	3	Urina de 24 horas (Mod. 35.1)
MIEL	Mielograma	Sangue	2	Contactar Dr. Luis Marinho (so feito na sede)
MIOGLO	Mioglobina	Sangue	8	Jejum
483	Opiáceos	Urina	2	Amostra ocasional
OSTEO	Osteocalcina	Sangue	8	
A156	Oxalatos na urina	Urina	8	Urina de 24 horas (Mod. 35.1)
PTH	Paratormona intacta (iPTH)	Sangue	5	
PEPTC	Peptídeo C	Sangue	8	
255	Pesquisa de Sangue Oculto	Fezes	2	Dieta (Mod.37.2)
1	Phadiotop	Sangue	2	Jejum. Pesquisa de alérgenos inalantes.
6	Plaquetas	Sangue	2	Ocasional, de preferência em jejum
PORFTOT	Porfirinas	Urina	8	Urina de 24 horas (Mod. 35.1). Frasco escuro.
Ks	Potássio	Sangue/Urina	2	S: Jejum, excepto em SOS U: Urina de 24 horas (Mod.35.1)
27	Progesterona	Sangue	2	Jejum
266	Prolactina	Sangue	2	Jejum
	Prolactina (doseamentos)	Sangue	2	consiste em 3 doseamentos (0', 20' e 40')
JONES	Proteína Bence Jones	Urina	8	Urina de 24 horas (Mod.35.1)
PCF	Proteína C da Coagulação	Sangue	8	
650	Proteína C Reactiva	Sangue	3	Jejum, excepto em SOS
PROTS	Proteína S da Coagulação	Sangue	8	
152	Proteínas Totais	Sangue/Urina	2	S: Jejum U: Urina de 24h (Mod.35.1)
149	Proteinograma	Sangue	3	Jejum
	Prova de O'Sullivan	Sangue	2	Colher em jejum e 1 hora após 50 g de glicose.
157	Prova de tolerância à glicose	Sangue	2	O doente deve estar em jejum. Vai ser submetido a 4 colheitas de sangue. Após a 1ª colheita vai ingerir uma solução com 100 g. de glicose e 1, 2 e 3 horas após irá ser submetido a novas colheitas de sangue. Administrar 100g de Glicose (crianças: 1.75g de Glicose/Kg massa corporal até um máximo de 75g); Colheitas aos 0 min; 60 min; 120 min e 180 min
	Prova de Weber	Fezes	2	Ver Pesquisa de Sangue oculto nas fezes
296	PSA Livre	Sangue	2	Jejum
403	PSA Total	Sangue	2	Antigénio Específico da Próstata; Jejum
221	RA Teste = Factor Reumatóide	Sangue	3	Jejum
	RAST = IgE específico	Sangue	5	Jejum; Ver lista de alérgenos
222	Reacção de Waller Rose	Sangue	3	Jejum
285	Reacção Paul Bunnell	Sangue	2	Jejum

	ou Mononucleose			
280	Reacção Weil Felix	Sangue	2	Jejum
281	Reacção Widall	Sangue	2	Jejum
282	Reacção Wright	Sangue	2	Jejum
270	Renina	Sangue	8	
7	Reticulócitos	Sangue	2	Ocasional, de preferência em jejum
RETRAC	Retracção do Coágulo	Sangue	2	
ROTA-F2	Rotavírus	Sangue	8	
RUBIGM RUBIGG	Rubéola (Ac. das classes IgM e IgG)	Sangue	2	Título de ac. Anti-Rubéola classes IgM e IgG; Jejum
SEDIMUR	Sedimento Urinário	Urina	2	Colheita por micção espontânea, após higiene dos genitais externos; Preferencialmente 1ª micção da manhã
SELENIO	Selénio	Sangue	8	
Nas	Sódio	Sangue	2	Jejum, excepto em SOS
286	Somatomedina C	Sangue	8	Sm-C
287	Somatotrofina (STH)	Sangue	8	Jejum
15*	T3	Sangue	2	Jejum
290*	T3 Livre	Sangue	2	Jejum
16	T4	Sangue	2	Jejum
292	T4 Livre	Sangue	2	Jejum
49	Tempo Cefalino Caulino	Sangue	2	Ocasional
32	Tempo de Coagulação	Sangue	2	
9	Tempo de Protrombina	Sangue	2	Ocasional
TEOF	Teofilina	Sangue	8	Colher antes da toma da manhã.
78	Teste de Gravidez	Sangue/Urina	2	Pesq. De HCG na urina (teste c/ limite inferior de sensibilidade diagnóstica: 25 UI/L Registrar nº de dias de atraso
39	Testosterona Livre	Sangue	8	Jejum
38*	Testosterona Total	Sangue	2	Jejum
102	TGO / AST	Sangue	2	Transaminase Glutâmico-Oxalacética; Jejum
103	TGP/ALT	Sangue	2	Transaminase Glutâmico-Pirúvica; Jejum
625	Tiroglobulina	Sangue	8	
219	Título Antiestreptolisina O	Sangue	3	Jejum
TOXIGM TOXIGG	Toxoplasmose (Ac. Das classes IgM e IgG)	Sangue	2	Título de Ac. Anti-Toxoplasmose das classes IgM e IgG; Jejum
246	TPHA	Sangue	3	Jejum
126	Transferrina	Sangue	5	
99	Triglicérideos	Sangue	2	Jejum 12 h; mínimo 8h
492	Tromboteste	Sangue	2	Ocasional
17	TSH	Sangue	2	Jejum
TST	Two-Seven-Ten (II-VII-X)	Sangue	2	Ocasional
93	Ureia	Sangue/Urina	2	S: Jejum, excepto se SOS U: Urina de 24 horas (Mod.35.1)
488	Urina tipo II	Urina	2	Colheita de urina preferencialmente a 1ª micção da manhã
218	VDRL	Sangue	3	Jejum
5	Velocidade de Sedimentação	Sangue	2	Ocasional; de preferência em jejum
189	Vitamina A	Sangue	8	

190	Vitamina B 12	Sangue	5	Jejum
191	Vitamina C	Sangue	8	
192	Vitamina D	Sangue	8	
VE	Vitamina E	Sangue	8	
301	VLDL Colesterol	Sangue	2	Jejum 12 h; mínimo 8h
264	VMA	Urina	8	Dieta s/ café, baunilha, chocolate, etc; Medicamentos: Aspirina, etc Urina de 24 horas (Mod. 36.1)
ZNS	Zinco	Sangue	8	